(LSCE/LATMOS)

INCA / REPROBUS
(chimie atmosphérique)
(aérosol)

(LMD)

LMDZ
(atmosphère)

ORCHIDEE

(surfaces continentales)
(végétation)

(LSCE/LMD)

(CERFACS)

OASIS
(coupleur)

OPA
(océan)

LIM
(glace de mer)

PISCES
(biogéochimie marine)

NEMO
(LOCEAN)

Quantifier l'effet de la hausse des émissions de gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique global.

© CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project phase 5 - 2013)
IPCC AR5 (Intergovernmental Panel Climate Change, Assessment Report 5)

✚ Simulations "centennales" passées et futures

- 20 et 21ème siècle, dernier millénaire, paléoclimat
- 167 expériences, 25000 ans simulés, 2 Po de données dont 0.5 Po distribuées
- 3 ans calculateurs vectoriel SX9 (mercure 48 procs) éq. 2 millions d'heures Curie
- Fichiers à fréquence mensuel, journalière et haute fréquence (6h).
 - 800+ variables par fichiers + métadonnées associées
 - **5 Millions de fichier générés, 2 Po de données stockées et distribuées.**

© CMIP 6 : 2017~ 2019

✚ => x 7 sur volume données générées

- **14 Po de données**
- **300 Millions d'heures sur Curie (TGCC)**

80% - 90% du temps de calcul

✚ **Cœur dynamique** : résolution des équations de Navier-Stocke sur la sphère en milieu tournant (Coriolis) + qq hypothèses (couche mince, approximation hydrostatique) => équations primitives

✚ **Partie physique** : interactions au sein d'une même colonne d'atmosphère : rayonnement, convection, nuages, précipitations, couche limite...

Coordonnée verticale
hybride σ -pression

Grille régulière longitude-latitude

Grille alternée (Grille C)

Schéma conservatif d'ordre 2 (Sadourny 75)

Conservation de la masse et de l'énergie/ensrophie

2 points singuliers aux pôles

- Violation des critères de stabilité CFL
- Filtrage des courtes longueurs d'ondes près des pôles

Parallélisme hybride MPI-OpenMP

- Découpage MPI sur la latitude
- Tâches OpenMP sur la verticale

Impact des points singuliers aux pôles sur le parallélisme

- Découpage 1D sur l'horizontale
- Déséquilibre de charge
- Traitements spécifiques aux pôles, couteux en temps CPU

30 ans de modèle couplé à haute résolution

- 25 km océan ($\frac{1}{4}^\circ$), 30 km atmosphère ($\frac{1}{3}^\circ$) : grille 768x767x39
- 2200 cœurs de calcul (2048 atmosphère, 128 océan)

- 1024 cœurs: ~ speed-up 820
- 2048 cœurs : ~ speed-up 1200
- Difficile de dépasser les 10 000 cœurs...**

✚ Principaux objectifs

- Ouvrir la voie vers l'exascale et supprimer les goulets d'étranglement dus aux points singuliers du maillage
 - Basculer LMDZ vers une grille quasi-uniforme
- Se préparer aux architectures de supercalcul du futur
 - GPU, many cores, vectorisation, I/O...
- Préserver les caractéristiques actuelles du dycore de LMDZ (conservations...)
- Développer une version non-hydrostatique pour la très haute résolution (<10km)

✚ Migrer vers une grille icosaédrique à mailles hexagonales

- Obtenue par raffinement successif de l'icosaèdre
 - Discrétisation sur le maillage dual
 - Hexagones et de 12 pentagones
- Suppression de la singularité aux pôles
 - Maillage quasi-uniforme

Level 0

Level 1

Level 2

Revisiter nos schémas numériques sur la sphere

- Coeur hydrostatatique (pour le moment) sur grille C

$$\frac{\partial m}{\partial t} + \frac{\partial W}{\partial \eta} + \nabla_{\eta} \cdot (\overline{m^h u}) \quad m = -\frac{1}{g} \frac{\partial p}{\partial \eta}$$

$$\frac{\partial m q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial \eta} (W \overline{q^v}) + \nabla_{\eta} \cdot (U \overline{q^h}) = S_q$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \eta} + g \frac{m}{\rho^v} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\frac{\partial u}{\partial \eta} W^{vh}}{\overline{m^h}} + \frac{(f + \nabla_{\eta} \times u) \times u}{\overline{m^h}} \text{TRISK} \\ + \nabla_{\eta} \left(\frac{\overline{u^2}^h}{2} + \Phi \right) + \overline{\theta^h} \nabla_{\eta} \pi = S_u$$

Schéma TRISK

Thuburn *et al.* (2010)

Ringler *et al.* (2010)

- Dissipation (viscosité) explicite 4ème ord (bi-laplacien)
- Schéma d'intégration temporelle explicite (RK4, ARK 2.5)

Grille alternée
(type C Arakawa)

- Nouveaux schémas numériques "TRISK"
 - Généralisation des schémas type "Sadourny" aux maillages non structurés
 - 2nd ordre, conservation de la masse et de l'énergie
- Transport 2nd ordre défini positif, volume fini à limiteur de pente)
- Discrétisation vertical similaire à LMDZ (hybride σ -pression)

✚ Etirement de la grille (transformée de Schmitt)

- Transformation conforme
- Ajustement des termes métriques

- Exemple : résolution $8^\circ \rightarrow \frac{1}{2}^\circ$

Cas tests académiques

- Exercices DCMIP : Dynamical Core Model Intercomparaison Project
 - Participation à DCMIP 2012 et DCMIP 2016 (Boulder)

Short term test case (30 days)
Baroclinic instability (C. Jablonowski)
Kinetic energy spectra

zonal-mean zonal wind U (m/s)
Long term climatic test case (1000 days)
Held-Suarez test case

Maillage semi-structuré

- Triangles principaux appariés 2 à 2
- 10 tuiles-losanges pavé d'hexagones
- Mappées sur des tableaux 2D réguliers

Préserve la localité des données

- Accès aux voisins avec un offset constant en mémoire quelque soit la maille
- Accès contigu à la mémoire
- Optimisation des accès mémoires et du cache
- Vectorisation (Xéon Φ & GPU)

✚ Exemple de stencil : opérateur divergence

```

DO l=1,llm      ! loops on vertical levels
  DO ij=ij_begin,ij_end  ! Loops on horizontal layer
    dhi(ij,l)=-1./Ai(ij)*(
      ue(ij+u_right,l) * le(ij+u_right)  &
      - ue(ij+u_rup,l)   * le(ij+u_rup)   &
      + ue(ij+u_lup,l)   * le(ij+u_lup)   &
      - ue(ij+u_left,l)  * le(ij+u_left)  &
      + ue(ij+u_ldown,l) * le(ij+u_ldown) &
      - ue(ij+u_rdown,l) * le(ij+u_rdown))

  ENDDO
ENDDO
  
```

- Boucles 100% vectorielles
- Pas de traitement particulier pour les pentagones
 - Ajustement des termes métriques : ex : $l_e = 0$ pour un des coté de l'hexagone
- Déroutement de la boucle horizontale sur une seule dimension => longs vecteurs

✚ DYNAMICO vectoriel à 99.7 %

- ~ 60% de la performance crête sur calculateur vectoriel NEC SX8

Approche hybride MPI/OpenMP

- Un losange se décompose trivialement en sous-losange

3 Niveaux de parallélisme

- **Parallélisme MPI par décomposition de domaine horizontaux**
 - Transfert des halos de recouvrement par communication MPI
- **Parallélisme OpenMP par distribution de domaines horizontaux**
 - Chaque tâche (thread) reçoit un domaine
 - Transfert des halos par mémoire partagée
- **Parallélisme OpenMP sur la verticale (mémoire partagée)**
 - Ajout de directives OpenMP sur les boucles verticales

Plusieurs centaines de threads par processus MPI

- => futures architectures many-cores (ex: Xeon Φ)

I/O serveur parallèle et post-traitement "In Situ"

- Description du workflow par un fichier XML externe
- Serveurs I/O asynchrones dédiés aux lectures/écritures
- Lectures / écritures parallèles
- Gestion des grilles non-structurées
- Bonne scalabilité sur des milliers de cœurs de calcul

- Interpolation à la volée : grille non structurée / grille régulière

Etudes atmosphériques de géantes gazeuses (A. Spiga et al., LMD)

Grand défi du CINES 2015 : Simulation à très haute résolution de l'atmosphère de Saturne

- 11 Millions d'heures consommées sur 2 mois, 12 000 cœurs, 80 To de données générées.
- Très hautes résolutions : $\frac{1}{2}^\circ$, $\frac{1}{4}^\circ$ et $\frac{1}{8}^\circ$ (12 km éq. terrestre : 4 096 000 x 64 mailles)

Scalabilité testée jusqu'à 60 000 cœurs.

Nb cœurs

✚ Futures Etudes

- Jupiter (A. Spiga)
- Exoplanètes "Jupiter chaud" (S. Fromang, P. Tremblain)
-

- Objectifs : accélérer le temps de restitution des simulations climatiques
 - Simulation globale à très haute résolution (25km).
 - Simulation paléo-climatique : faible résolution mais 20 000 ans d'intégration.

Cas idéalisé aqua-planète

- LMDZ Vs DYNAMICO : résolution ~300km

Résolution (degrés ~ km)	Nombre de cœurs	Années / jours
3° ~ 300 km	2 560	272
1° ~ 100 km	20 480	85
1/2° ~ 50 km	82 000	42
1/3° ~ 33 km	184 000	28
1/4 ° ~ 25 km	328 000	21
1/8° ~ 12 km	1 300 000	10

- Faibles résolutions (~ 300-100 km) : x20
- Hautes résolutions (~ 50-10 km) : x40

🕒 Objectif : participer à HighRes MIP $\frac{1}{4}^\circ$ global, horizon 2018

✚ Dynamico - physique LMDZ : aquaplanète

- Simulations idéalisées : planète océan

✚ Dynamico - physique LMDZ : bucket

- Relief, climatologie de l'ozone, aérosol...

✚ Dynamico - physique LMDZ - ORCHIDEE

- Ajout des surfaces continentales et de la végétation
- Ajout du routage de l'eau (rivières)

✚ Couplage DYNAMICO-LMDZOR-NEMO

- Ajout du couplage avec le modèle océanique

✚ Premier runs globaux fin-2017...

Vorticity ($1.73e-8/s$)

wind (m/s)